


<b>I.E.D. MONSEÑOR AGUSTÍN GUTIÉRREZ - FÓMEQUE</b>			
	<b>Asignatura:</b> Química	<b>Grado:</b> UNDÉCIMO	<b>Periodo:</b> 1
	<b>LEYES DE LOS GASES</b>		
			<b>ESTUDIANTE:</b> _____
			<b>Curso:</b> _____
<b>ESTÁNDAR:</b> Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia.		<b>DBA:</b> Comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre Temperatura (T), Presión (P), Volumen (V) y Cantidad de sustancia (n).	
<b>DESEMPEÑOS:</b> <b>PARA APRENDER:</b> las relaciones matemáticas entre variables como la presión, la temperatura, la cantidad de gas y el volumen, identificando las leyes de los gases (Boyle-Mariotte, Charles, Gay-Lussac, Ley combinada, ecuación de estado). <b>PARA HACER:</b> experimentos para identificar las leyes de los gases. <b>PARA SER:</b> encontrar temas fascinantes, explorar y descubrir nuevas cosas. <b>PARA CONVIVIR:</b> Tratar a todas las personas como iguales en consonancia con las nociones de equidad y justicia.		<b>EVALUACIÓN.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Trabajo y participación en clase</li> <li>➤ Desarrollo de las actividades propuestas</li> <li>➤ Puntualidad y calidad del trabajo en la entrega</li> <li>➤ Trato respetuoso con compañeros y docentes</li> </ul> <b>Fuentes de consulta o material de apoyo</b> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=SoDg3UDBqYU">https://www.youtube.com/watch?v=SoDg3UDBqYU</a> leyes de los gases	

## EL ESTADO GASEOSO


Los gases al igual que los líquidos, son fluidos y están compuestos de partículas en movimiento constante y al azar. Se expanden hasta llenar el recipiente que los contiene y, también se pueden comprimir. Carecen de forma definida y se difunden fácilmente.

<b>VARIABLES QUE DETERMINAN EL COMPORTAMIENTO DE LOS GASES</b>			
VARIABLE	DEFINICIÓN	UNIDADES	INSTRUMENTO DE MEDIDA
<b>Volumen</b>	Es igual al del recipiente que lo contiene	Litro (l), mililitro (ml)	Material volumétrico
<b>Presión</b>	Fuerza con la que la molécula de gas golpean una unidad de área.	Atmósfera: atm milímetro de mercurio: mmHg	Barómetro manómetro
<b>Masa</b>	Es la cantidad de gas que se toma.	Moles: n; gramos: g	Balanza
<b>temperatura</b>	Energía cinética promedio de las partículas que se encuentran en el sistema.	Grados celcius: °C Grados Kelvin: K	termómetro

## TEORÍA CINÉTICO MOLECULAR

Es el producto de los trabajos realizados por **James Clero Maxwell**, **Ludwing Boltzmann** y otros, quienes establecieron que las propiedades físicas de los gases se explican a partir del movimiento de las partículas individuales, siendo esta una forma de energía: la energía cinética. Esta teoría plantea lo siguiente:

1. Un gas se compone de partículas pequeñísimas, llamadas moléculas, muy separadas entre sí y con un volumen despreciable, lo que implica que la mayor parte de un gas sea espacio vacío.
2. Las partículas en fase gaseosa se mueven en diferentes direcciones, a grandes velocidades y en línea recta mientras no encuentren ningún obstáculo, en cuyo caso chocan con este, de manera elástica, cambiando de dirección. Se entiende por choque elástico cuando las partículas involucradas no ceden ni reciben energía.
3. Las partículas no interactúan unas con otras, incluso a distancias mínimas.
4. La temperatura del gas está relacionada con la energía cinética promedio de las moléculas del gas. A la misma temperatura dos gases tendrán la misma energía cinética.



**PRESIÓN DE LOS GASES:** las moléculas de un gas chocan entre sí y con las paredes de los envases que las contienen. Así, ejercen presión sobre cualquier superficie con la cual entren en contacto: por ejemplo, el aire encerrado en un neumático ejerce presión sobre las paredes internas de este.

La presión se define como la fuerza por unidad de área:  $P=F/A$ , donde  $P$ =presión;  $F$ = fuerza;  $A$ = área

La presión atmosférica no es uniforme en todos los sitios de la Tierra: depende de la cantidad de gases presentes en la atmósfera y ésta, a su vez, es variable. La mayor presión se registrará a nivel del mar y va disminuyendo con la altura. A la presión registrada a nivel del mar se le denomina una (1) atmósfera de presión y presenta las siguientes equivalencias:

**1 atm (atmósfera) = 76 cm Hg (centímetros de mercurio) = 760 mm Hg (milímetros de mercurio) = 760 torr (Torricelli)**

**Ejercicio:** ¿A cuántos mm Hg equivalen 2,5 atm? Utilizando los factores de conversión

$$2,5 \text{ atm} \times \frac{760 \text{ mm Hg}}{1 \text{ atm}} = 1900 \text{ mm Hg}$$

**Ejercicio:** convertir a atmósferas 560 mm Hg, utilizando los factores de conversión

$$560 \text{ mm Hg} \times \frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ mm Hg}} = 0,737 \text{ atm}$$

**TEMPERATURA DE LOS GASES:** la temperatura es una medida de la energía cinética de las partículas en movimiento. Cuando se trabaja con gases la temperatura se expresa en grados centígrados; °C o en grados Kelvin, K. La relación entre estas dos escalas de temperatura se expresa a través de la igualdad  $K = °C + 273$

**Ejercicio:** convertir 80 °C a Kelvin.  $K = 80 + 273 = 353 K$

**Ejercicio:** convertir -50 °C a Kelvin.  $K = -50 + 273 = 223 K$

### ACTIVIDAD 1:

- Convertir a atmósferas: a. 70 mm Hg    b. 12000 mm Hg    c. 950 torr
- Convertir a Kelvin:    a. 400 °C    b. 90 °C    c. -273 °C

### LEYES DE LOS GASES

LEY	ENUNCIADO	ECUACIÓN
<b>BOYLE</b>	El volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión, cuando la temperatura es constante.	$V_1 \cdot P_1 = V_2 \cdot P_2$
<b>CHARLES</b>	El volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, cuando la presión es constante.	$V_1 \cdot T_2 = V_2 \cdot T_1$
<b>GAY- LUSSAC</b>	La presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura, si el volumen es constante.	$P_1 \cdot T_2 = P_2 \cdot T_1$
<b>COMBINADA</b>	Se relacionan la ley de Boyle, Charles y Gay – Lussac, es decir no se mantiene variable constante.	$\frac{V_1 \cdot P_1}{T_1} = \frac{V_2 \cdot P_2}{T_2}$
<b>DALTON</b>	A temperatura y volúmenes constantes , la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de la presión parcial ejercida de cada gas.	$P_{total} = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$

#### Ejemplo:

¿Cuál será la presión ejercida por un gas que se encuentra en un recipiente de 5 L a una presión de 3,5 atm y a 27 °C, si se aumenta la temperatura a 50 °C y el volumen del recipiente no varía?

Identificar de acuerdo a la información dada a que ley de los gases se refiere y resuelva el problema.

**Solución:** en la interpretación del ejercicio, es necesario tener en cuenta que el volumen del recipiente permanece constante, la temperatura cambia y se evidencia un cambio en la presión; por lo tanto, la ley que se debe aplicar a la solución del problema es la de Gay-Lussac:  $P_1 \cdot T_2 = P_2 \cdot T_1$

Obtenemos los datos	Resolvemos el problema
V= 5 L, constante P <sub>1</sub> = 3,5 atm T <sub>1</sub> = 27 °C = 330 K (pasar a Kelvin) P <sub>2</sub> = ¿? T <sub>2</sub> = 50°C = 323 K (pasar a Kelvin)	$P_1 T_2 = P_2 T_1$ ; despejamos P <sub>2</sub> de la ecuación: $P_2 = P_1 x \frac{T_2}{T_1}$ ; reemplazamos por los datos del problema $P_2 = 3,5 atm x \frac{323 K}{330 K} = 3,7 atm$ m

### ACTIVIDAD 2. Identificar la ley que se aplica en cada uno de los ejercicios y resolverlos.

- El volumen del aire en los pulmones de una persona es de 615 mL aproximadamente, a una presión de 760 mmHg. La inhalación ocurre cuando la presión de los pulmones desciende a 752 mm Hg ¿A qué volumen se expanden los pulmones?
- Es peligroso que los envases de aerosoles se expongan al calor. Si una lata de fijador para el cabello a una presión de 4 atmósferas y a una temperatura ambiente de 27 °C se arroja al fuego y el envase alcanza los 402 °C ¿Cuál ser á su nueva presión? La lata puede explotar si la presión interna ejerce 6080 mmHg ¿Qué probabilidad hay de que explote?

3. . Un alpinista inhala 500 mL de air e a una temperatura de 10°C ¿Qué volumen ocupará el aire en sus pulmones si su temperatura corporal es de 37°C?
4. . Se libera una burbuja de 25 mL del tanque de oxígeno de un buzo que se encuentra a una presión de 4 atmósferas y a una temperatura de 11°C. ¿Cuál es el volumen de la burbuja cuando ésta alcanza la superficie del océano, dónde la presión es de 1 atm y la temperatura es de 18 °C?
5. . Un globo aerostático de 750 mL se infla con helio a 8 °C y a una presión de 380 atmósferas ¿Cuál es el nuevo volumen del globo en la atmósfera a presión de 0,20 atm y temperatura de 45°C?

### **ACTIVIDAD 3. Laboratorio**

1. Escoger dos de las leyes de los gases, plantear y realizar un experimento, que las demuestre.
2. Para cada experimento determinar que materiales va a utilizar.
3. Describir el procedimiento a seguir (pasos para realizarlo)
4. Realizar el experimento explicando cada paso que hace y como se evidencia la ley que escogió
5. Tome fotos donde aparezca realizando la actividad.